

DISPUTATIO
DE
HÆMORRHAGIA
NARIUM.

Solenniter in Universitate Argentinensium
proposita


à

MELCHIORE SEBIZIO,
MEDICINAE DOCTORE AC PRO-
FESSORE ORDINARIO, COMITE
Palatino Cæsareo, & Reipubl.
Archiatro:

Respondente

JOHANNE DANIELE WILVISHEIMIO,
ARGENTORATENSI.

Die Mens. Decembr. 13.



ARGENTORATI,
Typis EBERHARDI WELPERI.
M. DC. XLIX.



VIRO

CLARISSIMO ET EXP E-
RIENTISSIMO,

DN. JOHANNI JACOBO
SIGLERO, Medicinæ Doctori eximio,
Practico apud Argentoratenses felicissimo:

NEC NON

VIRO

REVERENDA DIGNITATE ORNATISSIMO;

DN. M. PHILIPPO FIEGLE-
R O, Summi Templi Argentoratensium
Diacono fidelissimo, meritissimo:

*Dominis Patronis & Promotoribus suis debita
animi submissione perpetuo colendis,*

Disputationem hanc de Hæmorrhagia narium,
in sui studiorumque suorum commen-
dationem

Offert & consecrat

JOH. DANIEL WILVISHEIM,
Respondens.



THESES I.



Venadmodum aliorum sensuum organa suos patiuntur affectus, morbos scil. ac symptomata, ita & olfactus sensorium, ipse nimirum Nasus, non paucis morbis & symptomatis diversis divexatur.

II. Inter symptomata autem illius haud postremum locum HAE MORRHAGIA obtinet. Frequenter enim in praxi nobis occurrit, & adeo nonnunquam enormis est & impetuosa, ut agrè admodum sisti queat, & propterea laborantem non raro ob spirituum dissipationem, calorū diminutionem, ac sanguinis, qui commune est totius corporis alimentum, effluxum, in vita discrimen adducat.

III. Schenckius lib. 1. observat. 359. aliquot prodigiosæ narium hemorrhagiæ historias ex Matthæo de Gradibus, Brasavolo, Marcello Donato, & Amato Lusitano recenset, quibus planum facit, sanguinis libras 18 20. & 40. intra spatiū unius, quinque, & sex dierum ē naribus erupisse.

IV. Itaque digna nobis visa est hemorrhagia, cuius & θεωρία, & περιέξις explicetur. Ac in illa quidem nomenclaturæ, significata, definitio, genus, pars affecta, differentiæ, causæ, signa, tūm διαγνώσιν, tūm προγνώσιν declarentur. In hac verò curandi ratio proponatur.

V. SIGNIFICATI A hemorrhagiæ quod attinet, habet vocabulum istud numero tria. Primum enim omne sanguinis profluvium denotat, sive confertim & copiosè, sive parcè ex venis, aut arteriis, interiorum, vel exteriorum partium fiat. Fluere autem sponte, & quidem frequentius, quam aliunde, solet, ex

ore, naribus, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene intesti-
nis, venis hemorrhoidalibus, utero, vasisque urinariis.

VI. Deinde id solummodo profluvium sonat, quod sit af-
fatum, ἀπὸ τῆς παγῆσαι, οὐ παγέειν, quod est apud Hippocratem
ἀθρόως ὄφην, cum impetu prodire. Παγῆσαι enim, inquit Gale-
nus in explanatione vocum Hippocraticarum id indigitat, quod
conferunt impetum facit: estque αἷμον παγία dictio ab ea com-
posita.

VII. Tertiò pro illo sanguinis profluvio usurpatur, quod
e naribus contingere solet. Est igitur prima significatio genera-
lisima: specialior secunda: specialissima tertia.

VIII. Hippocrates hemorrhagiae vocabulum aliquando
ponit simpliciter, sine additione partis, unde sanguis emanat: &
cum eruptionem sanguinis e naribus inaudit. Accommodare au-
tem videtur αἷμον παγίας nomen narium profluvio καὶ ἐξοχὴν,
I. quia utrique sexui, omnibusque etatibus, in & extra morbos,
accidere solet. II. quia cetera sanguinis profluvia peculiaribus
nomenclaturis sunt insignita, quae vel à termino, unde prodeunt,
vel à loco, per quem feruntur, vel à tempore, quo fiunt, petun-
tur. Unde καλαμήσαι, γυρακῆσαι, λόχια, δυσεγέρια, αἷμαλώδεις,
αἷμοστίσαι, σγήσαι αἷμαλώδεις &c. appellantur. Interdum vero
nares addit. Quando vero de sanguinis profusione ex aliis
partibus verba facit, illarum ut plurimum meminit, & unde
sanguis prodeat, exponit. Sic enim Galenus comm. I. in
libr. I. epid. §. 9. & comm. 3. in I. 6. epid. §. 25. monet.

IX. Neque hoc aliquid novi est, cum sciamus, etiam alia
vocabula plurima, quae generalia sunt, specialiter usurpari: quem
admodum pleuritidis, peripneumoniae, hepatitidis, splenitidis, ne-
phritidis, arthritidis &c. exemplo probari potest. Significant enim
voceis istae quemlibet pleurae, pulmonum, hepatis, splenis, articulo-
rum renunque affectum: usus tamen, quem penes & jus est, &
lex, & norma loquendi, ut Horatij verbis utamur, obtinuit, ut
in specie solūm dictarum partium inflammatores exprimant.

Quam-

Quamvis haud nos lateat, nephritidem communiter etiam cal-
culum renum, & arthritidem articulorum dolorem sonare.

X. Hippocrates affectum nostrum in Coacis, prognosticis & propheticis etiam αἴματος πύσην ἡγένετο αἴματος διὰ πύσην, πύσην τὴν μυκήτηραν, καὶ κατὰ τὰς πύσας, & αἷμοφρόνην dialecto ionica appellat.

XI. Est autem hemorragia, ut ad DEFINITIONEM accedamus, sanguinis profutum conferim è noribus, critice, vel symptomaticè factum. Vnde Author. defin. medicin. scribit, αἷμοφράγιας εἶναι λάθρον αἵματος ἐκχυσιν, esse abundantem, imperuosam, rapidamque sanguinis effusionem: hocque nomine ab hemorrhoidē differre, quae est κατὰ περιστήδησιν, καὶ κατὸλίγον αἵματος Φορὰ, sanguinis delatio per dissultationem ac paulatim facta: quanquam praxis doceat, per venas hemorrhoidales non-nunquam etiam magnum sanguinis copiam emanare.

XII. Ex hac definitione constat, hemorragiam symptoma esse in genere immodec excretorum. Sequitur autem vel symptoma aliud, nemp̄ retentricis facultatis imbecillitatem, aut expultricis laceſſitatem indignationem: vel solutam in vasis continuitatem: vel ipsem sanguis sua quantitate, aut qualitate in causa est, uti mox dicemus.

XIII. Hic autem queri solet, qualisnam sit excretio ista? Et plerique omnes respondent, excretionem esse toto genere præter naturam. Galenus enim lib. de vivor. anat. c. i. l. de cur. rat. per S. M. c. 5. Comment. 5. aphor. 64. & l. 6. de loc. affect. c. 4. scribit, sanguinem esse vite thesaurum, naturæ dilectum filium, commune corporis nostri pabulum, fomentam nativi caloris, succumque nobis valde amicum, imò eorum omnium, que in corpore nostro sunt, maximè nobis familiarem. Ideoque illum si bi reservare quam maximè studet. Quodsi erumpat, non immerito evacuationem toto genere præter naturam esse credendum: quoniam id excernitur, quod est naturalissimum, quodque in corpore manere debet.

q̄stio.

XIV. Nos distinctè respondendum esse arbitramur. Symptomaticum enim sanguinis fluxum excretionem præter naturam esse putamus, & ratione temporis, si fiat statim in principio acutorum morborum, & ratione materiæ effluentis: criticum verò nequaquam tam excretionem statuimus: quoniam fieri solet ex propria nature intentione, conantis se liberare ab eo onere, quo veluti gravi sarcina premebatur. At quod studio & opera Naturæ fit, quomodo toto genere præter naturam dici potest?

XV. Sive ergo sanguinis abundantia in sanis, sive superfluus ac vitiosus sanguis in ægris Naturæ instinctu excernatur, talis sanè excretio naturalis & critica, neutiquam toto genere præter naturam vocari meretur.

XVI. At si symptomatice in principio statim morborum, nullis prægressis signis concoctionis, nullo cum levamine decumbentis, neq; in die aliquo decretorio sanguis evacuetur, haud immerito vacuatio toto genere præter naturam censetur: præsertim cum non sanguis, sed humor aliis, ægritudini occasionem & ansam præbuit. Excernitur enim, quod causa morbi non est, quodque manere in corpore debet.

XVII. Objecies, sanguinem naturalissimum quid esse. Quis ergo illius excretio non possit toto genere præter naturam nominari? Respondemus, naturalissimum quid esse, & Naturæ familiarissimum, si neque in quantitate, neque in qualitate peccet. At si nimius sit in quantitate, aut in qualitate vitiosus, tantum abesse, ut Naturæ familiarissimus sit, ut etiam eidem planè adversetur. Nimius enim venarum rupturam, suffocationem nativi caloris, inflammationes viscerum, apoplexiam, aliosque periculosos ac lethales affectus minatur: vitiosus autem & putridus putridas febres, ac cum primis συνόχεσι, ulcera, scabiem, mala alia generare solet: quemadmodum Galenus multis in locis suorum monumentorum docet.

XVIII. PARS AFFECTA nares sunt, quatenus per eas fluxus fit sanguineus. Afficiuntur autem nares vel per effsentiam,

fentiam, quando vasa illarum aperiuntur, rumpuntur, vulnerantur, eroduntur, contunduntur, aut ita rarefiunt, ut tenuior sanguis per illas quasi transcolari, & veluti sudor transmitti possit. Vel per consensum, cum vena & arteria partium aliarum, ac potissimum cerebri ejusque meninges, in naribus se exonerant.

XIX. DIFFERENTIAE petuntur à forma, loco, vasis, causis, modo generationis, quantitate, duratione &c.

XX. Ratione formæ alia haemorrhagia est critica, quando natura die critico, praegressis signis treuantus, in febribus acutis & ardentibus, phrenitide, cephalalgia sanguinea, aut à vaporibus acribus & fervidis excitata, angina, interiorum viscerum inflammationibus, cum europia egrotantis sanguinem per naribus excernit: sicut aliâs illum per venas uterinas in mulieribus, & per haemorrhoidas in viris eycere solet. Alia symptomatica, quæ vi morbi, seu cause morbificæ, Naturam copia gravantis, aut qualitate morbosa stimulantis & irritantis, in principio statim agitudo, nulla cum decubitus allevatione, sed potius cum dispendio virium accidit.

XXI. Ratione loci, unde prodit, alia immediate proveniunt à naribus, alia à cerebri & meninges vasis. Item, vel ex una, vel ex ambabus naribus contingit.

XXII. Ratione vasorum, alia sit ex arteriis, alia ex venis dictarum partium. Ex illis sanguis spirituosus & cardiacus: ex his hepaticus & alimentarius emanat.

XXIII. Ratione causarum, alia profecta est à causis internis, alia ab externis, quas jamjam enumerabimus.

XXIV. Ratione modi generationis, alia insequitur symptoma aliquod, v. g. infirmitatem Naturæ & Retentricis, non potentis orificio vasorum claudere, & sanguinem in illis detinere: alia morbo succedit, v. g. alicui continui solutionis speciei.

XXV. Ratione quantitatis effluentis sanguinis vel enor-
mis est valdeque impetuosa, quæ vires magnoperè deicere: vel
minus talis & remissior. Quodsi solum guttatum stillatimque
sanguis



sanguis effluat, non hemorrhagia, sed *ἀπόσαγχος*, & aqua? sanguinis cuncte perire, ab Hippocrate in Coacis, Stilla sanguinis ex naribus ab interpretibus nuncupatur.

XXVI. Ratione durationis alia durat continuè & diu, v. g. dies 2. 3. & plures: alia brevi cessat: sed per intervalla revertitur. Hinc etiam quædam periodica dicitur, quæ certis quibusdam temporibus redit: quædam semel tantum hominem adoritur, postea latet & quiescit.

XXVII. Sanguinis fluor, qui sanus per narēs obtingit, morbosus non est, sed laudabile Naturæ benè operantis opus, quo hominem illum maximè, qui vel sanguine abundat, vel eundem tenuem fervidumque habet, ob hepatis, aut victus caliditatem, ab imminentibus morbis præservat.

XXVIII. CAUSAHEMORRHAGIAE externe sunt atque internæ.

XXIX. Externæ sunt caliditas aëris nos ambientis, anni temporis, regionis, aut aestuariorum & stupharum ratione: diuerterior sub Sole mora & ambulatio: cibi calidi, acres & mordaces: quales sunt aromatibus valde conditi, aut sale multo imbuiti: adhuc sinapi, raphanus esculentus & rusticanus, Allium, cepa, porrum &c. Vina generosa & potentia. Exercitia corporis validæ, saltando, luctando, equitando, remigando, currendo, digladiando, aut alio modo instituta. Iracundia & excandescens. Talia siquidem sanguinem inflammant, & attenuant, vaseque aperiunt, imò quædam eorum illa quoque rumpunt. Ad hoc causarum genus externum etiam medicamina acria & mordacia, itemque res erodentes, contundentes, rumpentes, pungentes, & dissecantes, crebra narium frictio, referuntur.

XXX. Internæ sunt *ἀνασόμωσις*, orificiorum vasorum diductio, sive apertio: *διάβρωσις*, & *ἀναβρωσις*, vasorum erosio: *διάρρησις*, illorum divisio, seu disruptio: *διατήδησις*, tunicarum, quæ in vasibus sunt, rarefactio. Has enim causas in genere omnis αἱμορ̄-ρ̄αγίας esse Galenus l. 5. meth. med. c. 2. l. de sympt. differ. c. ult. & l. 3. de caus. sympt. e. 2. scribit.

31. Ayar-

XXXI. ἀνασόμωσις verò fit vel à nimia sanguinis copia: vel ab ejusdem fervore & acrimonia: vel à tenuitate & aquositate: vel à retentricis infirmitate, non potenter vasa claudere, quo fit, ut reseratis eorum osculis, sanguis effluat: vel à robore expultricis, gravatae à sanguinis copia, aut lacepsit ab ejus prava qualitate. Duabus enim causis concurrentibus, fluxus fit concitior. Vid. c. 6. I. de diff. sympt. Galeni.

XXXII. Διάβρωσις ortum trahit à rebus erodendi virtute præditis, internis pariter atque externis: cuiusmodi sunt illæ, quæ acres sunt, mordaces, causticae, cathæreticae, & escharoticae: uno verbo ab artis proceribus τυρπτικῆς appellatae.

XXXIII. Διάπερις causas habet res pungentes, quæ sunt acuminatae: secantes, quæ acutæ & tenues: contundentes, quæ graves & duræ: rumpentes, ut sunt vociferatio ingens, violenta spiritus coabitio, ponderis gravioris gestatio, aut elevatio, cursus admodum concitus, saltus violentus &c. Hæ enim posteriores causæ interventu λάσεως, tensionis, vasa disrupta, ait Galenus l. 5. meth. med. c. 2.

XXXIV. Διατηδησις oboritur juxta Galenum l. 5. meth. med. c. 2. propter vasorum tunicas rarefactas, sanguinem attenuatum, & exilium vasculorum oscula dilatata.

XXXV. SIGNA DIAGNOSTICA quod attinet, nihil ipsis opus est ad effluxus sanguinis è naribus cognitionem. Paritet enim visus. Opus autem est diagnosticis, ut scriatur, per quem modum αίμορραγία facta, & quæ illius causa existat.

XXXVI. Hemorrhagia, si per modum ἀνασομώσεως facta, cognoscitur, quando sanguis confertim affatimque exit, nec facilè sisti potest.

XXXVII. Si διάβρωσις occasionem dedit, paulatim spatioque temporis accidit, non subito & derepentè oboritur.

XXXVIII. Si διάπερις vasorum in causa est, sanguis subito & derepentè in majori quantitate, quam in ἀνασομώσεi, egreditur.

XXXIX. Si dia δ ω η δ ητις ansam prabuit, sanguis elabitur paucus, tenuis & serosus, qualis nonnunquam in hydropicis, hepaticis, & cacheticis effluere cernitur. Est enim dia δ ω η δ ητis solutæ continuitatis species, per quam sanguis aquosus & tenuis per rarefactas vasorum tunicas quasi transcolatur, & sudoris in modum transmittitur.

XL. Si ἀνασόμωσις causata est à copia & redundantia sanguinis, id nobis innotescit ex ijs indicis, quæ plethoram patefaciunt: v. g. ex venarum tumore, rubore faciei, tensione venarum & muscularum, habitu corporis carnoſo, ijs deniqz causis, quæ plethora producere solent: e.g. consuetæ alicujus vacuationis, v. g. uterina, hemorrhoidalis, narium, suppressione, victu liberali & pleno, qui ἐυχελθετικοὶ, ἐυχυμοὶ, καὶ τολυρόφοι, vita otiosa & ſedentaria, etate juvenili, anni tempore vernali &c.

Si excitata à sanguinis fervore, ſubtilitate & acrimonia quendam, id venamur ex hepatis caliditate, cuius signa Galenus tradit in μικρότεχνη cap 37. aëris fervore, precedente vietu calido, motibus validis & crebris, proclivitate ad iram, calidorum medicamentorum uſu, balneis, tūm ſiccis, tūm humidis, &c.

Si nata ob tenuitatem & aquositatem sanguinis, id nobis sanguis ipſe, qui emanat, manifestabit.

Si denique genita ab infirmitate retentricis, tunc ceteræ quoque facultates ferè languent, & sanguis interpolatis vicibus effluit, isque non admodum copiosus: praeceſſit etiam ut plurimum affectus aliquis, qui hepar genusque venofum enervavit.

XLI. Quodſi διάβρωτις malum peperit, hecque profecta sit à rebus externis, v. g. catbereticis, escharoticis & cauſticis, signis non egemus. Causa namque liquet, eamque ager Medico indicare potest. Sin praeceſſit a causis internis, humoribus ſcil. acrib. & mordacibus, quales ſunt bilioſi, porracei, & aruginosi, itemque pituitosi ſalfi & atrabilarij, aut ichores, ſerum & pus acſredinis particeps, tunc cognitione peti potest ex colore & conſtentia ex-euntis materieſi, temperatura laborantis, dieta antecedente, & ſi totum

rotum corpus κακόχυμον fuerit, etiam ex urinis & alvis egestionibus.

XLII. Denique si diarrhoea affectum produxit, sanguis quantitate paucus, stillatim guttatumque, qualitate vero tenuis & serosus profluere solet.

XLIII. Ceterum, an haemorrhagia critica sit, an symptomatica, facile appareat. Nam si contingat in morbo aliquo acuto, v. g. καισω, synocho putrida, angina, visceris alicujus phlegmone, fiatque cum iuvenia agri, illumque vel à morbo vindicet, vel saltem plurimum levet, & symptomatum vehementiam castiget; cadat insuper in diem criticum, si que indice aliquo die præmonstrata, & præcesserint signa nuptiæ per aquopayias futura, ut: pote rubedo oculorum, genarum, & narum, visus caligo, aue marmaryges, h.e. splendores ante oculos obversantes, lachrymarum effluxus spontaneus, cephalalgia gravans, atque distendens, arteriarum in temporibus pulsatio, narium pruritus, aurium tinnitus, desipientia, vigilia, tensio cervicis, pulsus magnus & validus, dyspnoea, thorace velut angustiore facto, hypochondriorum retractio, qua ultima signa humores superiora corporis membra petere ostendunt, critica dicenda est, præsertim si & astas decumbentis sit juvenilis, & astas, astivaque aëris natalis sit fuerit præsens, & temperamentum agri calidus, & constitutio ejus plethorica: quemadmodum pulchre & eleganter hæc indicia presaga Galenus tūm l. 3. de crisib. c. ult. tūm etiam l. 1. de cur. rat. ad Glaucon. cap. 15. proponit. Symptomatica autem, cum evenit statim in principio morbi, nullo cum agri levamine, & excitata tantum sit ob sanguinis copiam, naturam gravantem, vel ejusdem caliditatem & acridinem illam irritantem & ad excretionem stimulantem, vel etiam, quod quandoque in variolis, morbillis, febribusq; malignis & pestentialibus accidere consuevit, ob illius κακούθεα.

XLIV. Emanavit autem sanguis immediate ex venis narium, cum impetuose non erumpit, neque diu durat, sed facile



refrigerantium & adstringentium usu siccitur. Talia enim naribus admoventur, viribusque integris ad locum pertingunt affectum. Vena autem narium, quia exiles sunt & pauca, non admodum sanguine abundant. Ideoque copiosum reddere sanguinem non possunt. Possunt autem effundere largum vasa interiora, quae cerebri sunt & meningum. Itaque si sanguis emanet in copia, & fluxus diu perseveret, nec compesci facile queat, progressaque sint signa praecedenti thesi commemorata, si non omnia, saltem pleraque, statuendum, fluorem a vasis cerebri & meningum suam habuisse originem.

XLV. Cognosces autem sanguinem exiisse ex arterijs, si rutilus sit, clarus, tenuis, spirituosus, qui cum saltu quodam exiliat, spumosus, egrumque valde debilitet. E venis autem effusum esse deprehendes, si fuerit crassior, tenebricosior, impurior, minusque vires infirmet, & hepati topicis refrigerantibus, adstringentibus, aut divertentibus appositus, fluxus vel cesseret, vel saltem remissior evadat.

XLVI. Sequuntur PROGNOSTICA.

Enormes & immodicæ sanguinis per nares eruptiones spiri-
tus exhauriunt, calorem nativum penè extinguunt, concoctionem
laedunt, decolorationem efficiunt, cruditates gignunt, apoplexiam,
paralysin, οὐαχεῖαν & hydropem inducunt, totum corpus refrige-
rant, & jecoris ac ventriculi adferunt debilitatem. Galen. l. 9.
meth. med. c. 10. Quod tamen etiam de omnibus alijs immo-
deratis sanguinis profusionibus intelligendum quæ prater affe-
ctus modo recensitos etiam leipothymiam, syncopen, tandemque
mortem pariunt.

XLVII. Gordonius in lilio Medic. part. 3. c. 17. &
Valescus l. 2. c. 59. scribunt, si fluxus sanguinis narium se ex-
tendat ultra libras 4. malus est. Si ultra 8. pessimus. Si usque
ad 20. vel 24. lethalis. Addunt insuper, si in fluxu extrema fri-
geant, si facies appareat pallida, viridis, aut livida, sive plumbea,
signum esse itidem θανάσιμον. Authores tamen thesi 3. allegati,
sancte

sanctè affirmant, convalusisse agros suos, quib. sanguinis libræ 18.
20. & 40. effluxerant. Verum rara hæc sunt & prodigiosa, &
ut Averroës loqui solebat, monstris similia: nec nisi robori Na-
turæ accepta ferenda. Quib. adnumerari potest rarissimum il-
lud exemplum, quod Savonarola tradit tract. 6. prax. c. 5. rubr. 3.
Mulier, ait, grāvida, ex familia Zabarellorum Patavinorum oriun-
da, libras sanguinis circiter 22. ē narib. profudit: que tamen pe-
perit, & una cum fœtu supervixit.

XLVIII. Sanguinis fluxiones, αἷμα πότες, Verno po-
tissimum tempore hominibus obtingunt: Hippocrates sect. 3.
aphor. 20. Inaudit autem omnes sanguinis profusiones, sive per
nares (quæ profusiones in specie ἀπορρίψιαι dicuntur) sive per
hemorrhoidas, sive per uterum, sive per vomitum, sive per par-
tem aliam fiant. Quæ vacuatio illis præcipue accidit, qui san-
guinem vel ob cras in sanguineam, vel vixit plenum ac libera-
lem coacervarunt: idque eō magis, quia juxta Hippocratis pla-
citum lib. de Nat. hum. sanguis verno tempore dominatur, &
quotidiè incrementum capit. In causa est summa aëris tempe-
ries. Ideoque natura sanguinis quantitate gravata sese exonera-
re studet. Non solum autem à sanguinis copia, sed etiam ab alijs
humoribus sese verno tempore liberare satagit. Hinc Hippo-
crates eodem in aphorismo agritudines ex κακοχυμίᾳ geni-
tas addit: & genitas quidem vel ex κακοχυμίᾳ melancholica,
ut maniam, leprā & melancholiā: vel ex pituitosa, ut gravedi-
nes, raucedines, tusses: vel ex biliosa, ut pustulas ulcerosas: vel
ex serosa, ut articulorum dolores &c. Solet enim natura hoc
tempore profundum corporis expurgare, & fædas superfluitates
à partibus interioribus, tanquam nobilioribus, ad exteriores, us-
pote viliores, amandare: sic dictante Galeno in comment.
aphorismi allegati. Natura namqne Vere ob caloris, sanguinis,
& spirituum abundantiam est valida satis atque robusta: via ob
tempore aëris sunt patefactæ: ipsique humores fusi quasi & li-
quati, adeoque ad excretionem parati.

XLIX. Eadem pueris aqua & cunctis pueris maximè grandioribus & ad pubertatem accendentibus, qui jam, ut Hippocrates l. 6. epid. sect. 3. loquitur, αφροδισιάζειν ἀρχούται, οὐ τελείζειν, Venerem appetere & hircire, h. e. asperiorem reddere vocem incipiunt, similitudine à vocis hircinæ asperitate desumpta, accidunt, ait idem Hipp. ibid. & aphor. 27. sect. 3. Causa juxta Galenum comm. 3. in l. 6. epid. §. 25. est duplex: Una, sanguinis abundantia: altera ejusdem caliditas. Ante hanc etatem aderat quidem etiam sanguinis copia, inquit idem, verum haud pariter multis; quoniam tunc magis corpus crescebat. In comm. citati aphor. dicit Galenus, causam esse, quia tempore pubertatis sanguis abundare incipit, non quod tunc plus de eo generetur, quam prius, sed quod tunc minus ex ipso absimilatur, propterea quod & augmentum minus sit in hac etate, quam priore, nimis pro corporis proportione. Ob τωλυαπίαν & caliditatem etiam sanguinei & cholericæ magis huic malo expositi sunt, quam phlegmatici & melancholici.

L. Capite dolenti & vehementer laboranti pus, vel aqua, vel aqua pœv natali & râs pœvas, sanguis per narcs, aut os, aut aures effluens morbum solvit. Hipp. aphor. 10. l. 6.

Emissaria, per quæ superfuitates capitis excernuntur, sunt duplia: ordinaria & naturæ consueta: pori cutis, pericranij, meningum, cerebri, per quos halituosa evacuantur excrements, & narcs atq; palati foramina, per quæ educuntur humores noxijs. Extraordinaria sunt oculi & narcs. His utrorumque fit mentio. Pus per hæc loca eycitur, suppurata cerebri inflammatione. Aqua & pituita efferuntur, præsentibus humoribus crudis. Sanguis per narcs effluit, copia ejus naturam gravante. His evacuatis, fieri nequit, quin dolor, inde natus, desinat: quoniam ab ijs, tanquam à suis causis, dependebat. Quod si spiritus flatulentus dolorem perperit, hisce vacuationis generibus dolor non cessat, sed potius discutientibus & extenuantibus remedij evanescit. Si dolor ortus sit à bile acri atque mordaci, dolor χολαγωγοῖς, & alterantibus præsidj finitur.

51. Mitt-



LI. Mulierī menstruū præter naturam deficientibus, aīma
ēcī. Tūv pīwāv pūnva, sanguinem è naribus profluere, bono est.
Hipp. aphor. 33. scđt. 5.

Necessarium, inquit Galenus in comm. est, sanguinem mulieribus singulis fluere mensibus. Noxium autem, illum præter naturam retineri. Tolli verò noxam, si per locum alium vacuerit. Vacuari autem posse per loca multa. Sed innoxie per narres. Per alia non item. Per alia tamen exire, detimentosus esse, per alia minius. Laudare Hippocratem fluxum sanguinis per narres: sed non hanc solam viam approbare. Convenientem esse & illam, quæ sit per sedem. Quod licet Hippocrates non expressè dixerit, in more tamen positum habere Galenus scribit, ut uno & singulari posito exemplo, per illud similia alia subintelligat.

LII. Quibus per febres aures obsurduerunt, ijs aīna cī
pīvār pūēr, sanguis ē naribus profluens, aut perturbata alvus mer-
bum soluit. Hippocrat. aphor. 60. sect. 4. Simile prognosticum
habetur aphor. 28. sect. 4. inquit Galenus in comm. Vbi
Hippocrates scriptum reliquit, surditatem fieri, excrementus bi-
liosis retentio, & ad caput recurrentibus: talemque surditatem
cessare, alvo turbata, & bile per inferiora dejecta: dummodo
non hectica fuerit surditas, sed repente in febribus facta. Biliis
quippe, cùm meatus auditorios occupaverit, surditatem efficie.
Cùm verò natura hanc ipsam per alvum evacuārit, rationi con-
sonum est, surditatem evanescere. Allegato verò in aphorismo
Hippocrates docet, laxatam alvum, & ἀκουοππαγίαν barium
surditatem in febribus factam, absque ulla tamen propria & pre-
capua organi auditory passione, finire. Nihil autem mirum, sub-
dit Galenus in comm. si cùm evacuantur as transmutantur
noxiū humores, morbi desinant.

LIII. Vbi spes est ad articulos abscessum iri, abscessu liberat
urina multa crassa & alba reddita, qualis in febribus nowédeor,
laboriosis, quarto die quibusdam exire incipit. Quod si enī
pissimū cypoppaynū, sanguis etiam ex naribus profluxerit, brevi
admodum sit solutio. Hippocrates aph. 74. f. 4.

Per abscessus & decubitus febres chronicæ magna ex parte
judicantur, inquit Galenus l. 3. de cris. c. 3. Aliquando tamen
secus sit, & materia cruda crassaque, ex qua tales febres nascun-
tur, per urinæ vias κοπίκωνς evacuatur; unde urina multa crassa
& alba apparet: qualis in febribus laboriosis, non quæ vehemen-
tem motum & exercitium secutæ, sed quæ à cruda crassag, mate-
ria, etiam nullo prægresso exercitio, genitæ, & in quib. tamen
agri lassitudinem magnam sentiunt, quibusdam die ~~qua~~^{to} effluere incipit. Non autem quarto solùm, subjungit Galenus
in comm. sed etiam alio quovis indice, & decretorio. Exem-
pli enim gratia quarti solùm meminit Hippocrates, sed more suo
etiam alios inaudit. In ejusmodi igitur febribus lassitudinariis
expectari quidem solet abscessus, & quidem ad articulos, utpote
membra frigida, laxa, & debilia, alienam materiam facile ad-
mittentia, nec illam amplius ob infirmitatem naturæ suæ propel-
lentia: verùm valida natura materiam abscessus quandoque ad
ductus urinarios convertit. Unde fit, ut alio translata abscessus
præcaveatur. Quodsi calor febrilis sit intensior, tunc etiam san-
guis è naribus fluit: & quia is materiam ad caput propellit,
eam emunctoria cerebri, parotides, suscipiunt, indeque intu-
mescunt.

LIV. Que diebus criticis ex αἱμοφάγῳ incidit ~~τε-~~
~~χιψές~~, perfrigeratio magna, pessima est. Hippocr. in Co-
acis.

Ut nihil, ait Duretus in comm. paucum in upore est cri-
ticum, sic omne nimium, quantumvis criticum, est periculosum.
Quemadmodum igitur sanguinis substilla prava sunt, idque po-
zissimum die critico, ut omnes judicatoria cause exiguae, ita pro-
fusior omnis hæmorrhagia debet esse terrifica. Talis autem est
merito, & ut causa, & ut signum. Ut causa, quoniam corpus
reddit frigidissimum, eosque introduceit affectus, qui supra re-
censiti. Ut signum, quia retentricis infirmitatem prodit, non po-
tentis venarum oscula claudere, & sanguinem retinere.

55. San-

L V. Sanguinem ἀνάπαλιν è naribus fluere, malum: ut in
liene magno è dextris, atque similiter in hypochondrijs. Hippocr.
in Coacis.

Sensus aphorismi istius est, omnem αἷμορραγίαν, quae fit κατ'
ἴξιν, κατ' εὐθὺν, sive κατ' εὐθυωρίαν, bonam esse: malam contrā, quae
fit ἀνάπαλιν, è diverso, seu contra directum. Tò κατ' ίξιν autem
à natura observatur, si u. g. hepate laborante sanguis fluat è na-
re dextra: tò δὲ ἀνάπαλιν, si erumpat è nare sinistra. Ita si is in
lienī phlegmone exeat è nare sinistra, exire κατ' ίξιν dicitur: sin
è nare dextra prodeat, ἀνάπαλιν. Quam vacuandi rationem
Galenus libr. de curat. per S. M. c. 15. & 16. vehementer lau-
dat, & experientia confirmat, quae testatum fecit, vacuationes
κατ' ίξιν factas profuisse semper: hisce vero contrarias nihil ju-
vissé: imò interdum etiam nocuisse plurimum, quod scil. vires
solum, citra morbi levamen, dejecerit atque exolverit. Sic nam-
que in corpore nostro comparatum est, ut dextra dextris, sinistra
sinistris sint ὄμοφυλα καὶ εὐτῷσφύλα, consocialia.

Per hypochondria autem hoc loco interpretes, inter quos
Duretus & Hollerius primi, intelligunt hepar. Vox enim hy-
pochondriorum accipitur varie. I. συνενδοχικῶς pro toto imo
ventre: ut aphor. 73. sect. 4. II. μελανυμικῶς, pro partibus in
hypochondriis sitis. III. ἀνονυματικῶς, pro dextro: ut histor.
2. sect. 1. l. 3. epidem. de Hermocrate. IV. κυρίως καὶ ιδιῶς, pro
lateralibus regionis epigastricæ partibus, quae τοῖς χόνδροις, carti-
laginibus notharum costarum adjacent. Hypochondria namque
dicuntur, quod sint ὑπὸ τῶν χόνδρων, vel quod τῶν χόνδρων ὑπόκηλαι,
cartilaginibus notharum costarum subjaceant.

L VI. Que σκολώδεα, vertigines tenebricosa carentur ab
initio, αἷμορροιν ρίνος λύει, sanguinis profluvium è naribus sol-
vit. Hippocr. in Coacis. Vertigo, δινός, affectus est, in quo
omnia circumagi & in orbem verti videntur: cui si tenebrae ac-
cedant, adeò ut æger visu privetur, composito nomine σκοδοδίνος
vocatur, tenebricosa vertigo. Causa est inordinata spiritus fla-

tuosi crudique motio, qui vel in capite primum genitus est, vel sursum ex infernis partibus, v. g. ventriculo, liene, intestinis, utero &c. ascendit. Genitus autem in capite est, vel ex sanguine inibi redundante, vel ex cacockymia privata. Solvit igitur αἷμαρραγία narium vertiginem plethoricam, non cacockymon. Hanc enim purgatio tollit. Et solvit plethoricam, quae non cum inflammatione, aut intemperie capitis calida conjuncta. Hisce enim affectibus presentibus, vertigo persistit, non obstante sanguinis è naribus eruptione. Dicit autem Hippocrates ἐξ ἀρχῆς circa initia, scil. acutorum morborum sine ulla κρίσεως significazione. Nulla enim κρίσις in principio morborum fieri solet, inquit Galenus l. 3. de cris. c. 3. 6. & 10. quia tunc temporis morbifica materia adhuc est cruda, multoque minus ab utilibus humeribus separata, & ad excretionem disposita. Κρίσις enim bonam & salutarem praecedunt πενασμὸς καὶ διάπτωσις, concoctio & secretio heterogeneorum: sequitur ἔκκρισις ipsa, quam ταραχὴ κρίσης antegressa: absoluto κρίσεως actu, ηὲ φορίᾳ, bona agrotantis tolerantia insequitur, quod Galenus in opere critico sapè inculcat.

LVII. Quib. in febrib. sanguinis undecunque copia erupit, convalescentibus ventres humectantur: Hippocr. aphor. 27. sect. 4.

Similis aphorismus habetur apud eundem in Coacis, quib. αἷμαρραγία profusior est, labentibus inde diebus alvi πονηρότατι, labefactantur, nisi urina cocta reddatur.

Hoc symptoma commune quidem est cuiuscunque sanguinis profluvi largioris, ex quaunque parte id fiat, non male tamen ad narium haemorrhagiam in specie accommodari potest. Causa est, inquit Galenus comm. 4. aphor. 27. quia ob ejusmodi αἷμαρραγίας calor admodum debilitatur, ex quo viscera concoctioni & distributioni alimenti dicata neque bene concoquere, neque cibum in sanguinem convertere, neque in corpus distribuere queunt. Ideoque necesse est, alvos fieri humidiores, donec progressus tempore.

temporis natura vires suas recuperaverit: quod factum judicatur, si urina cocta apparuerit.

LVIII. Profusa narium αἱροφάγια violenter suppressa, σωστὶς nonnunquam parit. Sanat autem sanguinis detractio per phlebotomiam. Hippocr. in Coacis.

Sunt quidam ita meticulosi, ut lethale arbitrentur, si sanguis, etiam modice, ē naribus emanet. Putant enim, vita thesaurum effluere non debere. Proinde sistere statim αἱροφάγια satagunt, non præsidii revulsoris, sed refrigerantibus, adstringentibus, & repellentibus topicis, naribus, fronti, temporibus, & collo admotis. Idque eò magis, quò sanguis majori cum impetu erumpit. Verùm Hippocrates hoc dissuadet, innuens, si narium sanguis βίη vi si-
statur, tūm symptomata alia, tūm etiam convulsionem superve-
nire. Ut enim hæmorrhoidibus longo tempore consuetis, si incon-
sideratè suppressantur, secundum Hippocratem aph. 12. sect. 6.
periculum tabis, aut hydropis, & secundum alios melancholiae,
scirrhi, cancri & lepræ impendet, ita hæmorrhagia narium in-
tempestivè cohibita, convulsio, epilepsia &c. succedunt. Hinc il-
lud Hippocratis in Coacis, qui statis temporibus sanguinem
fundunt, si non profuderint, epileptici fiunt. Hæc quippe va-
cuatio in sanis, qui sanguine abundant, sàpè nature opus est.
In acutis morbis non raro critica est. At quæ judicantur, si-
nenda sunt, non impedienda, ait idem aphor. 20. sect. 1.
Subdit autem Hippocrates, αἱροφάγια ejusmodi phlebotomia
sistendam esse, siquidem eam sistere necesse fuerit. Nam venæ
sectio sanguinem retrahit, & à naribus avertit, si nimis hoc
in casu humeraria brachij κατ' ἔγγυ incidatur.

LIX. Substillæ sanguinis, (αἱ σάξεις) mala sunt, idq; cùm
aliās, tūm si bis fiant, & redeant. Hippocr. in Coacis.

Substillæ sanguinis sunt, quib. ille guttatum, pigro lapsu, &
pareè fluit. At ipsis peccans materia tota non evacuat: & pro-
pterea recidivam juxta aphor. 12. sect. 1. patiuntur agri, ob τὰ
ἴγκαλα μωμόνα, ea, quæ relinquuntur. Galenus ad aph. 47.



sect. 2. l. i. prorhet. hoc habet edictum, τῶν κριτῶν ἔδει σμικρὸν
εἶναι προσῆκε, eorum, qua critica sunt, nihil paucum esse conve-
nit. Rationem hanc subjungit, quia quod paucum excernitur,
aut malignos & multos humores naturae dominatu regi non pos-
se, aut summam naturae fatigentis exolutionem denunciat. Idem
judicium fert de sudatiunculis in prognost. quas, si miliares fue-
rint, & circa cervicem duntaxat & clavicularis apparuerint,
pessimas proclamat. Idem sentit Hippocrates aphor. 47. sect. 2.
l. i. prorhet. de vomitu exiguo, quem κακὸν pronunciat. Et in
Coacis τὰς ἐλαχίσας σάξιας, perexigua sanguinis stillicidia, κα-
κὰς similiter judicat: idque l. i. epidem. sect. 3. Philisci, Epa-
minonis, & Sileni exemplo confirmat, qui interierunt, quod
pusillum quid è naribus stillaverit: σμικρὸν, ait, ἀπὸ πνῶν ἐσάρεν,
ἡ ἀωθανοῦ; Addit autem Hippocrates, substilla sanguinis mala
esse, tūm alias, tūm si aliquoties redeant. Nam quō sapius na-
tura irritatur, & irrita tamen inanis ejus est conatus, eō pejus
eager se habere solet.

LX. Sanguinis è naribus fluxus die septimo, nono, & de-
cimo quarto febres ut plurimum solvit. Hippocr. in Coacis.

Febres scil. acutas atque ardentes, quales sunt synochæ, &
quæ in specie καύσοι appellantur. Criticus enim est ille fluxus:
peccans materia educitur per ξυμφέρουσα χωρία, convenientia lo-
ca, cessatque febrilis calor, & alia febris symptomata disparent.
Idem tamen narium fluxus salutaris quoque est in phrenitide,
angina, pleuritide, peripneumonia, phlegmone hepatis ac lienis;
Avicenna eundem etiam probat in variolis & morbillis. Bre-
viter, omnis sanguineus narium fluxus bonus est, qui sit cum al-
leviatione patientis. Signum quippe est, causam tolli, si non tota-
liter, saltē aliquā ex parte.

LXI. Supereft CVRATIO, que pro varietate causarum
variat. Respiciendum autem hic est I. ad morbum, unde fluor
manat. II. ad sanguinem ipsum, qui effluit. III. ad sympto-
mata, nimirū ad facultatem retentricem & fluxum sanguinis.

62. Mor-

LXII. Morbus vasorum, unde fluor prodit, est, sicuti
soprà dictum, vel eorum avasōμωσις, vel diaίρεσις, vel diάβρω-
σις, η ἀνάβρωσις, vel διαπήδησις.

LXIII. Sanguis peccat aut in quantitate, cùm nimis a-
bundat: aut in qualitate, quando vel calidior & acrior, vel te-
nuior & aquosior existit.

LXIV. Retentrix vasorum virtus aliquando adeò debili-
lis est atque infirma, ut neque vasa claudere, neque sanguinem
retinere valeat.

LXV. Fluxus quidem sanguinis symptoma tantum est, si-
cūt & infirmitas vasorum, ac propterea ambo neque curatione,
neq; præservatione opus habēt, cùm remotis causis ultrò desinant.
Quia tamen fluxus nonnunquam vehementer urget, naturamq;
causæ induit, ejusque, ut Galenus de omnibus in universum
symptomatibus urgentioribus lib. 12. meth. med. cap. I. monet,
vel vires nimioperè prosternentis, vel novum morbum producen-
tis, vel præsentem affectum foventis, idcirco ea cura illi debetur,
qua causis adhiberi consuevit.

LXVI. Quapropter, si αἷμα παγκατά facta sit per αὐασόμω-
σιν, orificia vasorum claudenda sunt. Si per diaίρεσιν, vasa glu-
tinanda. Si per diάβρωσιν, itidem consolidanda. Si per διαπή-
δησιν, condensanda. Perpetuò enim contraria contrarijs oppo-
nenda.

LXVII. Si sanguis peccet in quantitate, minuendus. Si
in qualitate acri, & calida, contemperandus & refrigerandus. Si
in tenui & aquosa, incrassandus. In utroque etiam vitio pur-
gandum, bilis & seri causa.

LXVIII. Si virtus retentrix debilis sit, roboranda venit.

LXIX. Fluxus ipse sanguinis coercendus & compescen-
dus, siquidem sit enormior, viresque deiciat, aut symptomaticus,
nihil agrum juvans, sed tantum illum enervans.

LXX. Sinendus autem, si fuerit criticus, aut naturæ opus
in sanis.

LXXI. Hæc est legitima & methodica cūm op̄ payias cū-
ratio, quæ indicationibus nititur, nobisque juvantia præsidia pa-
lām facit. Reliquum est, ut ad præsidiorum materias descenda-
mus, & quib. remedij dictis indicationibus satisfaciendum sit,
significemus. Depromemus verò illas ex monumentis artis
Antesignanorum, Galeni l. 3. de compos. med. & rōn. c. ult. Pauli
l. 3. c. 24. Aëtij tetr. 2. serm. 2. c. 94. Tralliani l. 3. c. 8. Avicen-
næ l. 3. Can. fen. 5. tract. 1. c. 9. Mesuæ l. 2. suum. 7. c. 2. & Sera-
pionis tract. 2. cap. de sang. flux. è narib. ex quib. pleraque
omnia, quæ ad pharmaciam spectant, superiorum ætatum Practi-
ci, Gordonius, Valescus, Nicol. Florentinus, Guainerius, Gat-
tinaria & Matth. de Gradib. hauserunt.

LXXII. Ut autem simus breviores, nihil peculiariter di-
cemus de ijs remedij, quæ vasorum oscula claudunt, que vasa
consolidant, quæque eadem condensant: quoniam sub illis compre-
henduntur, quæ fluxum sanguinis coērcent: cuius generis sunt
adstringentia, refrigerantia & emplastica. Nil quoque in me-
dium proferemus in specie de roborantibus retentricem virtu-
tem, quoniam sub adstringentibus inaudiuntur. Considerabimus
ea duntaxat, quæ fluori sanguinis medelam adferunt.

LXXIII. Adferunt autem primùm illa, quæ sanguinem
divertunt, derivant & intercipiunt, ne ad nares accurrat. De-
inde quæ fluxum ejus fistunt.

LXXIV. Divertunt & à naribus avertunt sequentia.
Primùm Venæ sectio κατ' ἔγν in humeraria brachij mature in-
stituta, priusquam vires deficiant: & quidem viciib. iteratis, bre-
vi interposito tempore, ter quaterque in die: ut Naturæ via alia
monstretur, eidemque illa paulatim assuecat: dummodo laboran-
tis vires ita adhuc sint comparatae, ut sanguinis detractionem to-
lerare valeant.

Deinde Cucurbitulæ magnæ, sine scarificatione hypocho-
ndriis affixa, dextro scil. vel sinistro, aut etiam utrique, pro ut ex
mare dextra, sinistra, vel utraq. sanguis fluxerit. Affixa etiam cer-
vici,

vici, interscapulo, & dorso, cum scarificatione: itemque sub mammis in sexu feminino.

Tertio Apertio venarum hæmorrhoidalium, præsertim si sanguinis fluor lienis causa sit obortus.

Quartò Ligaturæ dolorificæ brachiorum & pedum.

Quintò Frictiones extremorum deorsum factæ: & duriores quidem, ut partes inde rubeant, & sanguis à capite avocetur.

Sexto Sanguisugarum applicatio post aures.

Septimo Lavacra calida artuum inferiorum consulunt multi: verum suspecta videntur propterea, quod elatis ex aqua calente vaporibus, tūm partes cetera, tūm vel in primis etiam caput incalescat, & sanguis postea majori in quantitate erumpat.

Ottavo Purgantia, si non solum sanguis abundet, sed plethora etiam adjuncta sit nanoxympia, biliosa præsensim & serosa. Ea enim & vacuant, & revellunt. Vsurpanda autem mitiora: v. g. Manna, Tamarindi, Myrobalani citrina & chebulæ, Rhabarbarum, Cassia fistularis, Syrup. rosar. & violar. solut. simplex, Syrup. de cichor. cum rhabarb. Syrup. è florib. persicor. Syr. è rhabarb. &c. In nanoxympia vero phlegmatica φλεγμαγωγὰ: ut posse agaricum, myrobalani chebulæ, mel rosat. sol. Syr. de agar. & diacnicu. In melancholica φθελαναγωγὰ: nimirum sena, epythymum, myrobalani Indæ, decoct. & syr. è sena. Suadent quidam Practici, aquam frigidam per intervalla in faciem ægri incognitantis conyiciendam esse, ut illo per terrefacto sanguis ad interiora revocetur.

LXXV. Revulsionum præsidij usurpati, ad ea accedendum remedia, quæ sanguinis eruptionem sistunt.

LXXVI. Sunt autem interna atque externa: manifesta vel occulta qualitate agentia. Manifesta sanguinem compescunt, vel refrigerando, vel incrassando, vel adstringendo, vel infarciendo & obstruendo, vel urendo. Occulta, vel narcotica, vel alia, quæ verbis exprimi non potest. Veriusque generis receperimus plurima, ut in conspectu Artis Studiosi habeant, quæ à Pragmaticis passim literarum monumentis sunt consignata.

77. Ex-



LXXVII. Externa, quæ alias topica vocantur, varijs modis varijsque partibus admoventur: v.g. naribus, fronti, faciei, temporibus, cervici, collo toti, axillis, hypochondrijs, sub quibus hepar & lien comprehenduntur, testiculis, volis manuum, plantis pedum, carpis, & mammis in feminis.

LXXVIII. Intrinsecus usurpantur refrigerantia, incras-
santia & adstringentia: duo priora sanguinis gratia, qui refrige-
ratus & crassior factus ad motum fit pigrior atque ignavior. Po-
steriora vero vasorum causa, quorum orificia sunt claudenda.

LXXIX. Sanguinem refrigerant ex aquis, aq. lactuæ,
violarum, solani, papaveris albi, papaveris rubri, sive erratici,
nymphaeæ, sempervivi, alsines, endiviae, omnium florum, roris Ma-
jalis &c.

Ex Julepis, jul. rosat. & violat.

Ex Syrupis, syr. violarum, syrup. papaverin. syr. nymphaeæ,
syr. endiviae, diacodium.

Ex Conditis, lactuca Hispan. condita, rad. cichorii condita.

Ex Conservis, conser. violar. cons. nymphaeæ.

Ex hac materia & julepi, & electuaria confici solent.

LXXX. Vasa constringunt & occludunt ex Aquis,
aq. rosar. plantaginis, centinodæ, hippuridis, bursæ pastoris, por-
tulacæ, acetosæ, folior. quercus, tormentilla, anserinæ, cydoniorum,
cupular. glandium, fragorum, fragariæ, millefolij.

Ex Syrupis, syr. acetositat. citri, granator. acidor. ex succo li-
moniorum, auranciorum, acetosæ, berberum, ribium, uva imma-
tura, sive agrestæ, cydoniorum, fragorum, syrup. portulac. rosar.
siccar. rubi Idæi, corallinus, myrthinus.

Ex Conservis, Conser. acetosit. citri, acetosæ, rosar. rubrar.
acetosellæ.

Ex Conditis, berberes condit. ribesia condit. cynosbat. condit.
myrobalan. condit. pyra moschatell. condit. cydonia condit.

Ex Trochiscis, troch. de rosis, Ramich, de spodio, de terra
sigillat. de carabe, de berberib. de camphora. Quæ materia simi-
liter in julepos & electuaria aptari potest.

81. Hisce

LXXXI. Hisce internis medicamentis adduntur, quæ
vi narcotica sanguinis fluorem sedant, non tamen nisi summa
urgente necessitate, nec nisi viribus adhuc valentibus assumen-
da. Talia sunt, Laudanum opiatum Paracelsi, Requies Nicolai,
Philonium Persicum & Romanum, Opium ipsum, Micleta Nic.
Ad interna ischæma, sed occulto modo agentia, referri quoque
potest Sperniola Crollij compositum, quantitate avellanae cum
aqua plantaginis haustum. Ait enim, remedium esse ad quam-
vis sistendam aquopœzias efficacissimum.

LXXXII. Extrinsecus applicantur ex ordine quidem
eorum, quæ manifestis operantur qualitatibus, nimirum refrige-
rando, incrassando, repercutiendo, adstringendo, infarciendo, uren-
do, sequentia, quæ partibus thesi 77. enumeratis adhibentur.

Aquæ jam propositæ, aut per se, aut cum succis & pulveri-
bus mixtae.

Acetum rosarum, papaveris errat. & rubi Idæi, cum spon-
gia naribus oblatum. Vapor item naribus exceptus, qui exurgit
ex aceto candenti lapidi molari infuso. Hoc enim remedio
Aëtius laudem consecutus est non exiguum.

Oxycratum, sive Posca, quæ mixtura est ex aqua simpl.
& aceto.

Oxyrrhodinum, quod compositio est ex olei rosat. partibus
tribus, & quarta aceti. Additur à quibusdam etiam aq. Rosar.

Succi plantarum refrigerantium, adstringentium & incrassan-
tiuum, ex quib. aquæ recensitæ fuerunt elicite. Item hypocisthi-
dos & pruneolorum sylvestr. qui est Germanorum Acacia.

Pulveres, qui naribus insufflantur per cannulam.

Turundæ, quæ ipsisdem infiguntur.

Frontalia, quæ fronti temporibusque imponuntur, cum lin-
zeaminibus, spongia, xylo, stuppa.

Epicarpia, quæ carpis, sive brachialibus admoventur.

Errhina, sive nasalia, quæ naribus hauriuntur.

Epithemata, quæ hepatici applicantur, aut testibus circumli-
gantur.

D

Embro-



Embrochæ ad futuram coronalem factæ.

Emplastra & Cataplasmata ex pulverib. farinis, aceto, aut oleis adstringentibus concinnata, frontique admota.

Anacollemata, h. e. talia remedia, quæ naso, fronti, aut cervici quasi agglutinantur.

Fumi & vapores, qui naribus excipiuntur.

Periammata, quæ collo appensa gestantur.

LXXXIII. Materia verò talium pharmacorum præter aquas, acetam, & succos jam dictos, sunt, pulvis rad. tormentill. rad. bistort. rad. pentaphyll. rad. consolid. major. baccar. myrthi, nue. cupressi, rosar. rubrar. balauftior. malicorū, gallarum, crocè Martis, sanguin. Dracon. boli Armen. Terr. sigillat. terra Lemnia, aloëpaticæ, thuris, myrræ, mastichis, succini, lithargyri, cornu cerv. usq; santali rubri, rubrice fabrilis, farina volatilis, farina fabarum. farina lentium, farina triticea, farina amyli, gummi Arabic. gumm. Tragacanth. gypsum &c. qui pulveres cum ovi albumine, aut commemoratis succis & aceti mutari possunt in multas formulas.

LXXXIV. Caustica topica, sive actualiter, sive potentia liter urant, sanguinis quidem fluorem arcent, crustas, tanquam opercula, inducendo, ut chalcitis, calx viva, vitriolum, æs. & alumen usum, colcothar: verùm cùm terribilia plerisque sint, præsertim ferramenta cudentia, & etiam dolorifica, imò & propter vicinitatem oculorum & cerebri non satis tuta, raro a Practicis adhibentur, nec nisi in casu deplorato. Huc accedit & ista ratio, quoniam crusta, quam induxerunt, sponte, aut voluntate nostra ablata, fluxus redire solet.

LXXXV. Ex iis, quæ occulta qualitate sanguinem cohibent, forisque applicantur, sunt, fungus ille orbicularis, quem ridiculè crepitum lupi, nostri barbitonsores. Gubenfist appellat; lapis hematites, corallia rubra, & tintura illorum, jaspis, cornalinus, magnes, usnea, sive muscus ille, qui cranüs hominum defunctorum innascitur, siccus, & pulverisatus, na-

ribus q³

ribusque inflatus, aut sindoni rubra inditus, & de collo suspensus.

Stercus porcinum, aut asininum in nares inscio agro intrusus: aut succus ex illo expressus & cum bolo Armena subactus.

Spongia in forti aceto macerata: post arefacta & in fôtili cremata.

Cinis chartæ combustæ.

Bombax, sive Gossypium combustum.

Pili leporini, præsertim albi, ustione in cineres redacti.

Cinis asellorum, qui sub hydriis, seu vasis aquariis stabantur.

Sanguis columbarum, perdicum, turdorum, & turturum, similiter igni in cineres conversus.

Lapis carpionum in ore detentus.

Succus urticae majoris, porri, menthae, ocymi majoris cum camphora.

Herba anagallidis maris, qua phœnicei est coloris, in manibus gestata, ut & bellidis majoris.

Telæ aranearum mixta cum alijs.

Cochleæ cum domicilijs suis crematae, & cum succo, aut aqua aliqua, aut cum ovi albumine mixta, & naribus, fronti, temporibusque adhibita.

Folia & cortex salicis, præcipueque lanugo & flores naribus inserti: aut redacti in pollinem, & calamo in nares efflati.

Bufo palo transfixus, exiccatus, in pulverem tritus, linteolo, vel sindoni involutus, inque manu, donec incalescat, detentus.

Aqua ex spermate ranarum verno tempore destillata, & cum linteis admota fronti, temporibus, naribus. Miscetur & cum camphora & saccharo Saturni, colloque cum imbuto linteramine alligatur.

Semina cardui benedicti naso admota.

Testæ, sive putamina ovorum, in forti aceto macerata, donec mollescant, post siccata, & in pulverem redacta,

D 2

Radix



Radix Pæoniæ lingue subdita.

Radix melanthij masticata, naribus inserta, & de collo suspensa.

Radix cichorij albi circa festum D. Jacobi collecta, & dentibus contrita.

LXXXVI. Alia remedia, utpote verba, precatio[n]es & incantamenta carminum, quorum Plinius l. 28. c. 2. meminit, & aliquot illorum formulas Nicolaus Florentinus serm. 3. tract. 7. c. 2. proponit, silentio involvimus. Sunt enim partim superstitione, partim impia. Ideoque etiam Plinius, tametsi aliquid verbis & characteribus in medicatione morborum tribuere videatur, & carmina contra ambusta, aliaque agritudinum genera extare perhibeat, ingentem tamen obstatere verecundiam in tanta animorum varietate scribit, quo minus illa divulgentur. Proinde permittrit, ut ijs, pro ut libitum cuique fuerit, opinetur.

LXXXVII. DIETAM quod spectat (actum namque hactenus de cheirurgicis & pharmaceuticis praesidiis) opera danda, ut laborans decumbat in conclave nec calido nimis, nec etiam valde frigido. Is enim fluxum sanguineum auget: hoc vero præcicer illum sistit. Prospiciendum illi de cibo refrigerante, adstringente & incrassante: propinandi potus itidem refrigerandi constringendique facultate praediti: a salmis, aromatizatis, acribus que ferculis abstinentur: vinum meracum vitandum: ολιγοφόγον: siquidem sit adultior, debilior, & vino assuetus, concedendum: aut hujus loco decocta, emulsiones & julepi parandi: animo & corpore quiescendum: in dorsum reclinato capite versus posteriore: minime decumbendum, multoque minus hac situatione corporis somnus capiendus. Metus enim est, ne sanguis retrocedat, & partim in gulam, partim vero in asperam arteriam & fistulas pulmonum defluat, hominemque suffocando e medio tollat.

LXXXVIII. Cibi convenientes sunt isti, brodia alterata, pulmenta ex amylo, hordeo, oryza, milio &c. confecta: gelatina, carnes gallinarum, caporum, agnorum, haedorum, vitulorum, & ver-

& vervecum, aceto, succo limonum, citriorum, auranciorum, granatorum acidorum, agresta condita: poma, pyra, pruna, cydonia & cerasia cocta: pisces saxatiles: denique & olera, utpote spinachia, beta, lactuca, endivia, portulaca, acetosa &c. Avicenna scribit, cerebella gallinarum, multum & sapè comesta, singularem esse & cibum, & medicinam in sanguinis fluore.

LXXXI X. Potus sit vinum, quale thesi 87. descriptum: aut rubellum, sed dilutum aqua. Emulsio amygdalar. dulc. & sem. frig. major. cum decocto hordei, passular. flor. cordialium, glycyrrhiz. & sem. coriandri præparat. Decoctum ipsum per se, sine amygdalis, sumptum: Julepi ex aquis supra enumeratis & syrups acidulis confecti: quales præ ceteris sunt syr. acetos. citri; auranciorum; limonum; granator. acidor. acetosellæ, ribium, berberum. &c. Aqua chalybeata, itemque cum mastice, aut ligno lentiscino cocta. Decoctum rad. tormentillæ, in quo conserva rosar. rubrar. antiqua dissoluta, postea colatum.



COROLLARIA.

I.

Quæ hæmorrhagia frequentior, eâne, quæ ex venis, an quæ ex arteriis contingit? Rarior esse solet arteriarum. Et si enim sanguis arteriosus calidior sit, spirituosior & subtilior venoso; tamen cum arteriæ ob crassitatem, duritatem, & firmitatem substantiæ suæ, non tam facile aperiamur, rumpantur, erodantur, & vulnerentur, ac vena, quarum tunica est tenuis, simplex, & mollis, idcirco fluxus arteriosi sanguinis spontaneus minus frequens est, quam venosi. Vid. de hac ratione Galenum in genere loquentem lib. 3. de sympt. caus. cap. 2. Secus se res habet, si membra interiora & exteriora à causa aliqua externa rumpantur.

tur, dissecantur, perforentur, contundantur, aut erodantur. Tunc enim uterque sanguis effluit, quia uno eodemque tempore vasa venosi & arteriosi sanguinis continui solutionem patiuntur.

II.

Cur sanguis arteriosus ægrius sistatur, quam venosus?
Causæ sunt duæ. Vna ex parte contenti sanguinis: altera ex parte continentis vasis. Nam sanguis arteriosus tenuis est, fervidus, spirituosus, exilitq; veluti cum saltu, ac ob id agrè compescitur. Venosus contrario modo se habet, ac ob id sistitur faciliter. Arteriæ, cùm sint in perpetuo motu diastoles & systoles, siue tunica earum sicca & dura, propterea neque facile clauduntur, neque promptè consolidantur. Citius contrà vena, que quiescunt, & minus sicca sunt ac dura.

III.

Possitne sanguis naturali ex causa effluere per spiracula cutis, ut quasi sudor appareat sanguineus? Potest: idque testatum fecit experientia, & rationes quoque sunt in promptu. Nam sudorem quendam serosum sanguineum, per poros cutis undique erumpentem in Studioso quodam vidit Guil. Rondeletius l. de dignosc. morb. c. II. Fernelius scribit l. 6. παθολ. cap. 4. se sanguinem ab extremis venis, que in cutem desinunt, multis è locis effusum observasse. Aristoteles l. 3. part. an. c. 5. & l. 3. hist. an. c. 19. refert, aliquos interdum sanguineum sudasse sudorem. Idem referunt Theophrastus l. de sudorib. ex sententia Monæ Medici, & Galenus l. de util. respir. qui tamen inter rā vēda illius refertur. Rationes hujus excretionis dari possunt tres. I. est sanguinis tenuitas & aquositas, à debili calore genitus. II. Raritas & laxitas cutis, pororumq; ejus aperio. III. Facultatis retenericis venarum & hepatis infirmitas.

IV.

Cur utplurimū sanguis, qui exit per nares, subtilior sit puriorque eo, qui effluit per alia loca, ut per uterum, per venas sedis, per meatus urinæ &c.? Quia qui āvō repito levior

levisor esse tenetur, & consequenter etiam subtilior ac purior.
Qui natura fertur, gravior est, & propterea crassior, impuriorque:
qualis est melancholicus & phlegmaticus.

V.

Quam ob causam homini solummodo ex omni animalium numero sanguis e naribus fluat? Causam dat Aristoteles problem. 2. sect. 10. eamque esse dicit magnitudinem & humiditatem cerebri humani. Tale enim plurimum excrementi serosi & aquei producit, quod postea sanguini in venis permiscetur, eumque vitiat & tenuorem reddit. Hinc venae distentæ avasopiativ patiuntur. Oculis autem earum adapertis, sanguis effluit. Brutis cerebrum longè minus est, minusque humidum: nec ita facilè vapores ascendentcs excipit, ut humanum, cùm homo erectus incedat, bruta autem prona terram spectent.

VI.

Num sanguinis e naribus profluviū pro symptomate in genere excretorum, an pro opere Naturæ habendum? Symptoma est, si in principio statim affectus, aut ob retentricis infirmitatem sit obortum, nullo cum patientis levamine. Opus autem Naturæ est, tūm in sanguis, tūm in ægris, si fiat ἐν καρπῷ, ut Galenus in fine l. de diff. symptom. loquitur, h. e. tempestivè. En καρπῷ autem fieri excretiones ab eodem ibidem dicuntur, si τὰ λυτρῆγη, ea, qua molesta sunt, excernantur: si que vacuatio facilè toleretur, & homo à molestia, qua premebatur, liberetur, vel saltem haud mediocriter levetur. Ejusmodi actiones idem Galenus eodem in loco singulari Naturæ providentia fieri dicit, & indicia esse scribit ejusdem roboris ac virtutis, à redundantia, qua veluti sarcina, premebatur, se se exonerare studentis.

VII.

Nunquid hæmorrhagia mortem homini inferre queat? Omnidè, si sit immodica, & sisti nequeat. Causa fuerunt allatae 3 besi 2. Et Aristoteles subscribit l. s. hist. an. c. 19. Si, inquit,
multum




multum sanguinis effluat, anima deficit, h.e. leipothymia & syncope oboritur. Si nimium, vita interit. Perisse autem quosdam ex hemorrhagia narum enormi, historicorum monumenta docent. Hoc enim affectionis genere Adrianum Imperatorem, Attilam Hunnorum Regem, & Alexandrum, Basiliy Macedonis filium, extinctum esse memorant. Offerunt se quoque exempla nostro tempore non pauca.

VIII.

Quæ sint excretionis præter naturam differentiæ? Galenus l. de syptom. differ. c. ultimo tres recenset. Nam quæ excernuntur, vel peccant substantia, vel qualitate, vel quantitate. Nos addere possumus quartam, quando excretio fit per loca insolita & naturæ inusitata. Excretio substantiæ iratione præter naturam dicitur dupliciter. I. quando corpora peregrina, animata & animæ expertia, quorum plurimas species Schenckius l. 3. observat. 73. & seqq. collegit, evacuantur. II. cùm res quæpiam, quæ ipsa quidem naturalis est, sed quæ retineri potius, quam excerni debebat, exit: quo in numero sanguis est, si intempestivè expellatur. Excretio ratione loci præter naturam dicitur, cùm v. g. alvi fæces per os, urina per umbilicum, aut perineum, menstruum per nares, os, mammae, aures, oculos &c. egreditur. Excretio ratione qualitatis præter naturam perhibetur, si excreta vel in primis, vel in secundis qualitatibus à naturali statu recesserunt. Excretio ratione quantitatis præter naturam judicatur, cùm contenta vel immodicè efflunt, vel parciùs prodeunt, vel rariùs, quam deceat, evacuantur.

F I N I S.





Cf 133

(x 2609941)

VD17

Aus dem Nachlasse
des
Geh. M.-R. Prof. Dr. Ernst Blasius
der Universitäts-Bibliothek
geschenkt
von seinem Sohne
Dr. med. Heinrich Blasius in Berlin.



Farbkarte #13

B.I.G.

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

Inches
Centimetres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ATIO
HAGIA
IM.

Argentinensium

SEBIZIO,
ORE AC PRO-
TO, COMITE
& Reipubl.

WILVISHEIMIO,
TENSI.

Decembr. 13.

RATI,
WELPERI.
IX.