

Saure muerlich. Für 6 Personen röhlet man in etwof guten Weizen- 2 Lothflüßel Mehl mit einer geschüttelten Weizenmehl und einem Eßlöffel...

Kalbfleisch. Weiche, Waschen 1 Kilo Kalbfleisch (dies ist am besten) zerlegt das Fleisch klein in Stücke...

Apfel mit Gult. 12 mittelgroße Äpfel geschält, das Kernhaus entfernt, vorzüglich in Zuckersirup getaucht...

Wolfsmilch. In 50 Gramm reiner Butter läßt man 20 Gramm Mehl dazu schmelzen und gibt dann langsam 0,50 Liter Weizen...

Schneckenmilch. Aus einem kleinen, geschüttelten Schalen schneidet man 1 1/2 M. die große Schalen, läßt dieselben 4-5 Stunden in Milch liegen...

Windstich. 10 Pfennige. 1/2 Schale. 75 Gramm herbis Ambraklein werden fein und den Zucker geschält mit 60 Gr. gewogenen Ambraklein vermischt...

Hauswirtschaft.

Die Laiben des Kases werden weich, wenn sie 2-4 Stunden in eine Lösung schwefeliger Säure in Wasser gelegt werden.

Honigwein. 5 bis 8 Liter Honig werden in 60 Liter Wasser 1 1/2 bis 2 Stunden, wo möglich in Papieren Siegel gefüllt...

Wie viel Wasserlassen aus Kindern zu entfernen? Man bezieht die Wasserschicht zunächst auf beliebige Weise...

Verfahren und Kochrezepte wieder klar zu machen. Waschenbenutzte Getreide, die natürlich selbst abgewaschen sein müssen...

Verfahren und Kochrezepte wieder klar zu machen. Waschenbenutzte Getreide, die natürlich selbst abgewaschen sein müssen...

Erzene Sommerhandschuhe wäscht man am besten auf der Hand mit Seife...

Als Atlas werden Heden gewöhnlich mit Spiritus und einem Braunsteinpulver entzert. Namentlich Weisslinge werden auf diese Weise leicht gereinigt.

Tabakerei in der Hütte. Auch am Vormittag kann man die Hütte hübsch und sauber halten...

Waispflanzmittel haben bekanntlich die Eigenschaft, bereits im zweiten Jahre des Gebrauchs erheblich auszuweichen...

Keinere Mitteilungen.

Bestehende Photographien kann man wieder aufziehen, wenn man das Bild in eine verdünnte Lösung Quecksilberlösung taucht...

Das Ströben an Tischplatten und anderen Oberflächen macht nach Auftrieb und Verfestigung ein schlechtes Einbild durch sein Rauheitsgefühl...

Wasserpflanzen gibt man ein aldehydreiches Aussehen, wenn man dieselben mit einem Gemisch aus Essigsäure und Wasser mischt...

Verfahrensweise aus Mennig entzert man dadurch, daß man eine Mischung aus 2 Teilen Soda, 1 Teil geschlämmtem Weizenmehl...

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.

Wandstein. 20 Teile trockener, feiner Sand, 2 Teile fein gepulvertes Weizenmehl und 1 Teil zu Pulver geschlägt Kalk wird mit Weizenmehl oder Weizenmehl zu Kitt gemacht.



Der Bauernfreund. Halle a. S., den 4. November 1905

Krankheiten der Hühner.

Von G. St. (Nachdruck verboten.)

12. Die Krätze ist die Folge von Ueberhandnahme der Hühnerkrätze. Diese Mibe ist in der Wärme sehr lebhaft...

13. Beinbrüche. Bei allen Arten Geflügel, besonders bei größeren Tieren, kommen Beinbrüche vor, doch können diese zuweilen mit den einfachsten Mitteln geheilt werden...

14. Legenot kann bei Hühnern wie bei Tauben, besonders bei kaltem Wetter, häufig beobachtet. Zur Vermeidung des leibels ist Gewahren der frischen Eier (Einwickeln in erwärmte Tücher) und der Aufenthalt in einem warmen Naume erforderlich...

15. Legenot kann bei Hühnern wie bei Tauben, besonders bei kaltem Wetter, häufig beobachtet. Zur Vermeidung des leibels ist Gewahren der frischen Eier (Einwickeln in erwärmte Tücher) und der Aufenthalt in einem warmen Naume erforderlich...

16. Klumpfüße. Klumpfüße bei Hühnern werden durch eine Verletzung am Ballen des Fußes verursacht. Häufig entstehen sie durch Verabreichung von hohen Aufzuchtungen auf harten Boden...

17. Die Geflügelcholera. Die Geflügelcholera ist eine sehr gefährliche, leuchtartige, ansteckende Krankheit. Der Ausbreitungsstoff wird mit den Entleerungen der franken Tiere nach außen abgegeben...

in gentalem Fehler zu suchen. Ist durch Fütterung von Futterfack (pro Huhn täglich ein Kaffeeschöfel voll unter das Weichfutter) oder durch Verabreichung von geschämmtem Knoblauch eine Besserung nicht zu erzielen, so greift man am besten zum Schladmesser.

15. Kammgrund. Das beste Mittel hiergegen ist Benzol oder Karbolsäure mit Schmierleise zur Salbe (1 Teil Benzol oder Karbolsäure auf 20 Teile Schmierleise) gemacht und täglich eingerieben oder eine tägliche Einreibung mit der in der Apotheke erhältlichen weißen Präzipitatsalbe (1:6 bis 8) abwechselnd mit Seifenwäsungen. Ist der Ausschlag schon auf gefesterte Körperteile übergegangen, so ist es besser, die franken Tiere sofort zu töten und zu verbrennen.

16. Klumpfüße. Klumpfüße bei Hühnern werden durch eine Verletzung am Ballen des Fußes verursacht. Häufig entstehen sie durch Verabreichung von hohen Aufzuchtungen auf harten Boden. Aufzuchtungen sollten daher für schwere Hühner höchstens 40 Zentimeter und für leichte nur 1 Meter hoch sein und alle gleiche Höhe haben.

17. Die Geflügelcholera. Die Geflügelcholera ist eine sehr gefährliche, leuchtartige, ansteckende Krankheit. Der Ausbreitungsstoff wird mit den Entleerungen der franken Tiere nach außen abgegeben, und wenn er in das Futter oder das Getränk geraten ist, kann er mit diesem von gesunden Tieren aufgenommen werden und die letzteren dadurch anstecken.

Die Kranke dieser verheerenden Krankheit sind: Die Tiere sind krank, hocken herum, in den meisten Fällen fehlt die Fresslust, hingegen ist mehr Vegetar zum Saufen vorhanden. Es tritt Mattigkeit und starker Durstfall ein. Der Kopf ist hüpfig, weggelb, spärlich grünlich, mit Schweiß gemischt.

Auch das Legen schalenloser Eier ist leider eine nicht allzu seltene Erscheinung. Die Ursachen dieses krankhaften Zustandes sind teils in einem unvernünftigen Umlagerungen der Tiere, teils im Mangel von Kalkstoffen im Futter, teils

Druck und Verlag von W. Knuthsch — Verantw. Redakteur: Frau Hofwiler, beide in Halle a. S.



