

zu verwenden hat. Simmersee, Stachelbeeren und Johannisbeeren habe ich in dieser Weise eingepflanzt, nach und nach...

Zu bis jetzt nur von Konjekturen gesprochen, die streng genommen mehr eine Behauptung sind, als eine sichere Erkenntnis... Zu bis jetzt nur von Konjekturen gesprochen, die streng genommen mehr eine Behauptung sind, als eine sichere Erkenntnis...

Will man Apfelsinen, saure Kirichen oder Stachelbeeren für den Winter anpflanzen, so werden sowohl zu diesen als auch zu jenen...

Forstwirtschaftliche Arbeiten im Juli.

Eine wichtige Sache hat für den letzten Teil bemerkt, und es folgt Gewitter auf Gewitter. Diese gehen auch in der Regel in der Forstwirtschaft nicht vorüber, ohne hier und da teils geringere, teils größere Schäden anzurichten zu haben.

teners Ballenstücken sind häufig geworden. Man hat bei der Wahl, ob man Herbst- oder Frühjahrspflanzung machen will, sich nach den Umständen ins Auge zu fassen, so z. B. trockener oder nasser Standort...

Die American hat für den Bodmann sehr nützliche Insekten, weshalb wir sie zu schicken haben. Die Eier in den Spinnweben, Bogel- und Insektenverbindungen gut beobachtet werden, nicht man die Reifer und Samen an, um sich in Reich dieser wertvollen Bienen zu setzen.

Tagekalender für den Monat Juli.

Der zweite Monat war für den Jäger, wenigstens für viele, eine ruhige Zeit. Zwar wird mancher schon einen sehr großen Erfolg gehabt, und auch ebensolche schon 14 Tage vergeblich geübt haben.

Die Jagd auf Enten hat auch mit dem 1. Juli begonnen. Wie weitgederter Jäger kann ich diesbezüglich nicht empfehlen, bis gegen Ende dieses Monats. Man sollte doch immer berücksichtigen, daß noch zu viele Tümpeln nicht fischen können und somit vom Hund gefressen und abgewischt werden.

Wird wird bei der unvollkommenen Sättigung um diese Zeit möglichst nicht den unruhigen Winter zu verlassen. Alle der Größe Juli auf Enten gehen...

Landwirtschaft.

Wird das Getreide nach der Wintervergabe, so kommt es überhaupt ab zu verlieren, den Herbst hinein zu ziehen, und aber nur auf dem Boden anzufragen. Am ersten Falle bleibt nichts anderes übrig, als das Getreide zu mähen und entweder als Futter, Einstreu oder als Gründüngung für die nachfolgende Frucht zu benutzen.

Da die getrockneten Kartoffeln durchschnittlich in drei, oft erst in vier Wochen aufgehen, so kann sich in dieser Zeit noch wiederholte Regenfälle besonders auf schweren Böden eine so feste Kruste bilden, daß, um dieselbe zu brechen, außer dem später festzuhaltenden Boden ein Abarbeiten mit der Sense oder dem Pfluge...

Haus- und Zimmergarten.

Als Dünger für den Gemüsegarten eignet sich der gemischte Dünger anderer Düngstätten ganz gut, muß sich jedoch in kurzen, gemauerten Zuständen befinden, wenn er die Erde nicht so sehr lockern soll, eine solche Mischung aber wird vorteilhafter sein...

Obtrakt können dieselben als Düngemittel zwischen anderen Substraten, Garten mit gezogen werden, jedoch nur die frühesten Sorten, die Winter Glas, weiß und blau, Gravier Treibenbrunnen, weiß, Roth rosa, weiß, bei früherer Anstalt liefern die Goliathschokolade (weiß und blau) gegen Herbst reifere Erträge.

Was wird der Wurzelfestigkeit angeschlossen? Der Wurzelfestigkeit wird mit sehr gutem Erfolg angewendet, wo die Erbsen durch allzu starke Bildung von Wurzeln nicht hindern können sind. Remontiert leben wir diese Erscheinung bei Erbsen, welche auf nassem Boden mit durchdringendem Untergrund stehen.

Tier- und Geflügelzucht.

Verbauungsstörungen beim Rindvieh. Ein einfaches und sicheres Mittel gegen alte Verbauungsstörungen (Stille Wässer) beim Rindvieh, vorausgesetzt, daß nicht irgendwelche Fremdkörper im Magen, sondern Heberveränderung die Ursache ist, besteht in folgendem: Etwa zwei Pfund Rind werden auf Strohalmen zerrieben und sorgfältig geröstet, wie in einer guten Suppe. Nach dem Erkalten wird das Ganze in einer trockenen, gelben, dem franten Tiere vorbehalten. In vielen Fällen werden die Drosamen Tiere getroffen, ist das nicht der Fall, so werden dieselben nach und nach eingegeben.

Wann eignet sich das Stämmchen zur Zucht? Am Alter von 7-8 Monaten kann man daran gehen, die Jungtiere zur Zucht einzustellen. Aus dem vorhandenen Bestande suche man sich die kräftigsten und bestentwickeltesten Tiere zu diesem Zweck aus. Die übrigen stelle man zum Verkauf oder verwende sie als Schlichttiere in der eigenen Wirtschaft.

Abmachung bei Säuen. Trotz aller Pflege, trotz allen Putzes und aller Vorkehrungen will manches Säulen nicht wachsend. Das Tierchen hat an der Schwanzspitze gelitten. Genau so aber wie diese Krankheit bei Menschen im Stansstadium heilbar ist, so auch bei dem Geflügel. Schwanzspitzen und Schwanzfedern sind in vielen Fällen zur Anwendung anbringen. Als Arzneimittel kann man eine Mischung aus Sand, halben Eßlöffel Buntblei und Geflügel-Salvarsäure.

Geflügelmaln mit Wagnersmilch. Bei Anwendung von süßer Wagnersmilch zur Geflügelmaln erhält man ein ganz vorzügliches Fleisch. Während der Maln, die auf verfestigten Art durchgeführt werden kann, verabreicht man als Beschäftigung getrockneten Mais, auch Gerstengröße und Hahnenfuß. Alles mit der Milch gekocht. Nebenbei ist natürlich etwas Körnerfutter: geringere Weizen, Kleinfuriger Mais, Hafer zu geben. Nicht zu mäßig füttern, sondern mit Heisfrüchten, gemauerten Mais-Körnerfutter allein, wozu lauwarme Milch als Getränk verabreicht wurde.

Bienenwirtschaft.

Der Fütterung des Bräutigams der Bienen schiebe man unter den Wabenkasten ein dünnes Schwarzbrot, welche in guten Spring getrocknet ist. In trauriger Zeit ist nicht nur der Sonntag abgelegt, sondern auch die Prospektive vollständig angefallen und die Bienen gehen wie rasen auf den Bräutigam los. Als Futter bezeichnen dieses Mittel als ein sehr sicheres. Als Futter bezeichnen dieses Mittel als ein sehr sicheres. Als Futter bezeichnen dieses Mittel als ein sehr sicheres.

Vor dem Schmelzen des Waxes muß derselbe gründlich gewaschen werden. Man löse es nicht zu lange und halte sich kaltes Wasser bereit, um es große Eise bähnen zu können.

Als Schuttmittel gegen Ameisen auf Bienenstöcken hat sich das Ausstreuen von Zigarrenasche am Unterloggsbrett des Bienenstandes bewährt.

Geflügelstapfpege.

Eine Anweisung über die Winderkrankeidung? Die Wazale neigen im allgemeinen zu der Anstich, doch die Zunahme der Winderkrankeidung in neuerer Zeit eine scheinbare sei und das man selber nur das Wesen dieser Krankheit in den meisten Fällen nicht erkennt, doch eine Vermutung ist und das ist nicht ausgeschlossen gelten darf, es könnte auch eine besondere Ursache für eine tatsächliche Steigerung der Krankheitsanfälligkeit an diesem Weiden vorliegen. In diese Richtung weist ein Vortrag, Dr. Gemes vor dem Münchener Gesellschaft in München gehalten hat. Er deutete darauf auf den zunehmenden Umstand hin, daß zunächst in America die Vogelgrippe, die Entzündung eines Nerven, die trotz der Art der Erregung schon unzählige Todesfälle verursacht hat, mehr oder weniger abgeheilt mit der Einführung eines industriellen Verfahrens hätte geschehen ist, nämlich mit der Herstellung von Milch in Mältern mit höherem Malgen. In England wiederum sei die Zunahme der Krankheit seit der Einführung von so acromonien ansehnlichen Milch erzeugt. Am auffälligsten aber ist die Zahl, daß unter den Vögeln in America sich ebenfalls abgeheilt sein kann sein Beginn, als das gemahlene Mehl so billig wurde, daß die Vögel

