
Vanjetung mit einem reinen Haard.

1 Gegen Aufien bei Rübern. Mis gang vorplaticks Hausmittel gegen Huften bei Kindern empfielbt ich Merezwischelfoft. Wan fach die Blätter der gewöhnlichen Merezwischel mit Woffer wud recht viel weißem Jackertant zu einem firup-bicktichen Softe ein und albt denselben teelöffelweife ollte 2-3 Einthen dem Kinde. Es wird ihn gern nehmen und die Wirfung zeigt fich son ierb volle.

Baß noch drei Lage mit taltem reinem Walfer fieben und dann fann geiswerfelt vorben.

Se jude die Bestalder der Be





Der Bauernfreund

Canó- und Bauswirtschaftliche Beilage des General-Angeigers für Balle und die Proving Sachfen.

Salle a. G., 14. Marg

1914



Die fünftliche Düngung ber Felbund Gartenfrüchte.

Mr. 11

Ban D. M. in R.

sirma verdrängt oder benachteiligt werben.
Bei den folgenden turgen Auslighungen, aucherläche ich Speziale und Universal-Düngen. Au den erften echteren Killie und Ruppelabuter. Schweiselgauter Ummonioft. Euperphosobott, Kalifatz und geder aucher erführen gehren Auflichte und Aufleite und Killie und Killie und der Schweisel und der eine Auflichte und der Auflichte und der Auflichte und fiel und eine Auflichte und fest auflichte und fiel und eine Auflichte und fest auflichte und fest laften, es sieht das aus, als wolle man nicht durch die Gitte des ziegenen, sohnern durch den guten Aumen eines amderen Produltes Kellame machen. Bon den Ebezsialdungern dobe ich unter den vom mir auße

Bassenbe leicht beraussinden.

Bas bewährte sich: 1. Aur Winterweisen (alle Kranden besiehen sich auf 1 Settar – 4 preußiche Bergern). Seldbingung (60 Kriogramm Zbonasten). Seldbingung (60 Kriogramm Zbonasten). Montengamm keinti, 150—250 Kriogramm Lond, Montengamm keinti, 160—150 Kriogramm Thomasmel, 300 Kriogramm keinti, 160—150 Kriogramm ichn. Ammonial.

2. Hir Zinterrogen: Soldbingung (60—80) Kriogramm Zbonastenden (60—80) Kriogramm Zbonastenden (60—80) Kriogramm Komint. 200—250 Kriogramm sichen, Montenial.

Mittelbingung (400—50) Kriogramm Thomastendel (400—60) Kriogramm Kainti, 150—200 (Sho

Ammonist.

Schwede Dinaung 350—400 Kilogramm Thomasneth. 300—400 Kilogramm Aninit. 80—120 Kilogramm Aninit. 80 Kilogramm Isomonist. 80 Kilogramm Iso

immoniof.

8. Hir Gommerroggen wie Winterroggen. With the weigher gebüngt, do ilt der Neinertrag nicht is ob. Bas in der Neinertrag nicht is ob. Bas in der Angelensamen erden tann. sommt der Nachfrucht ungute.

6. Hir Hofter: Rollbingung 700 SNagramm homosmech, 600 Stigeramm Kankt, 150 Klischum kön immoniat.

Gine Schachtelhalm-Plantage.

Berheerungen der Borkenkäfer.

Bu den am meisten verbreiteten und schäcksichten geschen des gesc

D. Dafer meist als abhanenhe Frucht auf siemlich ausgelogene Rieder agist wird. io bat er fast
tiets eine Bolbimmann notig. Sollte er in bester
Dingergaben nm 3 berringerm.

7. Jürk Artosselfen: Soldingang 700—9900 Ricgramm I Homosself. 200—200 Ricgramm Hoprogramm I Homosself. 200—200 Ricgramm Hoprogramm I Homosself. 200—200 Rickertomm is
600 Klogramm Tomesself. 200—200 Rickertomm is
600 Rickertomm I Merchaltomm is
600 Rickertomm I Merchaltomm is
600 Rickertomm I Me



den gleichfalls die Haubtrolle, und ein berbortagender Sachverständiger, Arossessor Basser, der Diefter Basser, der Diefter Basser, der Diefter Basser, der Diefter Benfour, der Diefter Benfour, der Diefter Benfour, der Diefter Benfour, der Diefter Benfour der Benford der Berbeiter Berbalte in der Berbeiter der Beiter B

Die gunehmenbe Bebeutung bes Alfagrafes.

mije Steruchettung, bie frühre erft im Günführland bergenommen unreb, möhrend jett ende Majer (elst) ein
remonmen unreb, möhrend jett ende Majer (elst) ein
remonmen unreb, möhrend jett ende Majer (elst) ein
remonmen unrebe das Milogonas eine Studmitt. StudGunglamb allein mutchen 1912 bereits nabegti 200 000
Zonnen Milganas in getrömferen Mildnah eingrißbri,
ber eine Geendsteerminderung um eine 40 v. 5. ocean
aursphänischen Studanb beihnit. Der Sanselssöher
aursphänischen Studanb beihnit. Der Sanselssöher
aursphänischen Studanb beihnit. Der Sanstif aufmerfähnt,
baß bie Gintfußkigt methones and, in 20mitfalen
Berinde gu embjeblen, ob fich bas Ginchen unterBerinde gu embjeblen, ob fich bas Ginchen
stellen den der
Berinde gu embjeden, ob fich bas Ginchen
eigene mütche, in bemen es an Giespengebieten, fomest
Krista in Betrendt fomutt, ocean in die festly
Krista in Betrendt fomutt, ocean in die festly
Krista in Betrendt fomutt, ocean in die festly
Robertung ausgenerennen.

Algen im Trinfwaffer.

Bisher waren soch den Michael werden der dat bebentlichen Greignisse den Hand geworden, aber Dr. Berta dambern befannt geworden, aber Dr. Berta bertiget über den Hand geworden, aber Dr. Berta der Greiffichen Rahmstation. Die nicht der Greiffichen Rahmstation und die Greiffichen Rahmstation Rahmstation. Die nicht der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation. Die nicht der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation. Die amerikantionen Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation. Die der Greiffichen Rahmstation Rahmstation Rahmstation Rahmstation Rahmstation Rahmstation Rahmsta

Landwirtschaft.

tritt, find Bedampiungsverlude, möhrend beren fich die Krunftleit in einer Gegende einstillen sonne, aur nicht zu empfellen, im Gegenteil ist ein sjosrtiges tiefes Umpfligen bes Grundfliches und Bedaung bestelben mit anberen Pflanzen nötig. Beleißer berlieben Sehlitz ling genan zu bedondten, nun beim ersten Unseichen ber Krunftzeit eingreifen zu sonnen, und pawar ift bier beindrets der Aufruchs, des zweiten Schmittes im Ange ab balen. Außer bei italienidmen ist bie Aranfbeit auch bei französischen Rottlee beobachtet werben. Die Kranfbeit ist durch frembes Saatant eingefolept worden; es sichen sonnt des Kranfbeit ist durch frembes Saatant eingefolept worden; es sichen sonit die Kläsporen am Saatant sehrt zu balten und debauch der kreitet zu merken. Ein Mrihaften und baburd berbreitet au merben. Gin Auftreten ber Rrantheit follte aud fofort befannt ge-

Il Die Kranjel ber Blatifallfrantheit ber Sartoffel nimmt von Sahr au Jahr au, und in fendy-narmen Jahren fiehen die Rartoffieleber Ende Juli fast entlaubt da. Da nun die Allatte gur Ausbildung der Krudi außerorbentlich nötig find, Algen im Trinfwasser.

Beim von der Store des Existivassers auf der Angeleichen der Angeleiche

§ Magermild fann fovohl füß als angejänert verfüttert werden. Der Unterschied im Röhrwert fil 10 geting, dah man est gang dem Ermeffen des eingelnen überlassen fann, wie er sie verfüttern will. Durch erichlich Berwendung von Magermild wer-den Judt und Mass derbetet und derbilligt.

Sies Mild noch befer als eine Anfe Koffee.

8 Butterbereitung. Durch bie hoben Butterpreife der leigten Johre, die felhft durch die
Margarine nicht gedräch die felhft durch die
Matterragung wieder rentadel geworden, und
wo fein directer Mildwerfauf möglich ist, muß der
Matterragung größte Aufmerflamfeit angewonde
nerben. Der Landwirt muß der barauf bedacht
jein, gerade die miglicht an Arinde au liefern,
was für ihr de die die die die die die die
wos für ihr die die die
wos für ihr die die
wos für dar der der den
must gield durch die die
ben nut ielede wird auf begablt,
ben nut jelde wird auf de Auer gut begablt,

Saus- und 3immergarten.

** Beerenftrauche erhalten im Früstinge noch eine gute Düngung von Thomasmehl. Was davon nicht gleich bei der Blüte und Fruch verwandt wird, diel die Vortablingung im Woden und fommt der Früchtlichen gebreit der Wille und Freichtliche der Gruchtliche Gebruich bei der Fruchtlinospenbildung fürs neue Jahr

augute.

** Gelbstrankenber wither Bein. Der selbstrankende wilde Wein eignet fich vorzüglich aum Belleichen dem Bohnbalten, Mouern nim. Die fleinen Klammern deringen in jedes Mauerwert ein und halten is felt. dog ein belowbere Underten nicht nötig ist. Diese hübliche Schlingpflame ballt mu Abchen ohner Boberdung aus, in rangberen Sobenmaßt befannt ift, wird er meist Jungfernwein gemehr befannt ift, wird er meist Jungfernwein genonnt. Bilangen ind derto jede Greingeirnere ist
beziehen und fiellen sich im Eingelverlauf auf
60 Bennig.

** Freiland-Agalien find für Sausgarten und Areidanden gaten inm bir Quisgarten und Anlagen febr zu empfeblen. Man bat fie beute in allen Karben und bilden sie mit ihrem ungebeuren Plittenreichtume, ber noch vor ben Mättern er-icheint, eine beiondere Liebe der Garten, die dagu uoch in die biltenarme Zeit fällt.

Sier- und Geflügelzucht.

tt Sersdampfigleit der Pierde ift ein Uebel, welches meist durch gu große Unstrengungen bervorgerusen wird, nicht selten mit Lungendambjung gusammen guistit und einerjeits die Ardeitskraft der sammen aufritt und einerfeits die Arbeitskroft ber Teire äugert beeinträchtigt, andererieits auch zu theimmen Jusällen fübren kann. Die Herbähnipung ritt faft nur bei der Arbeit jutage, doggen scheinen die Tiere im Etalle vollständig geinnd zu sein. Die Herbähnipung zeigt sich desinvers an vortei sienell nachglieinde Muskeltroft und geringe Ausbauer. Sonit gute Kierbe siehen auf einmal solu und träge zu nerben. Dazu lägt der Appeiti noch und die Eckleimbäute der Aufrett, des Maules und der Augen werben blässen, der Buls wird ichnöcker und Lungame merben blässer. Der Buls wird ichnöcker und Lungame ner Peil i angerer Schomma und auter Amgen werden biöfter. Der Buls wird ichnöcher und langlamer. Dei längerer Schonung und guter Verlege gelingt es unter Beibilfe eines tichtigen Lier-arates, wohl eine Welferung berbeitzulieren, doch ifte eines die der Beiterung berbeitzulieren, doch ifte ist immerbin eine schwierige Soche, do das anicheinend gebeilte Lier bei größeren Anfrengungen manchmal wieder gurrichfällt. Bird dos Tier nicht geschont, is fellt in do känfager itarfer Schweife ein, das Derz schlögt racher und unrichtiger, Altem-beichwerten gesellen ich binna und in hurger Beit bermandelt sich ein fostbares Beferd in einen wert-lesen abgegeren Kipperer, Fürlinge ist and bester all Rachforge, und doch erne beinders Besiger, die mit Anchten arbeiten, gut, benn sie barauf sehen, daß den Verener

ber natüridie Glanş ichli.
†† Träfthoglier und Mildertrag. Die Temperatur bes Träntwolfers bat Einflus auf die Gelundeit und den Mildertrag ber Küle. Berüche ergaben, daß Kübe, deren Trintwolfer 21 Grad E. warm war, pro Egg & Jitter mehr Rich gaden als jolde, die gang faltes Trintwolfer erhelten. Um ga ichen, od der Berjad auf gang richtig lei, gad man dann der erften Gruppe daß falte und der zweiter Beller. Ein die Bergere Beller E. Bei Miltung war überod kennentere Balfer. Die Miltung war überzeugend. Während die erste Gruppe sosort im Er trag zuruckzing, stieg die andere Stuse in gleicher Weise, so bag man nicht mehr zweiseln konnte.

Beife, jo baß man nicht mehr gweifein fonnte.

11 Die Moune-Geire gebört au mieren, größen Entenarten und geichnet fich gubem burch gutes Afteid und beichte, ichnelle Wooft und. Geit ift mit gang meng Baller gutreben, und da fie ein buntie on betraumes Freetrich beigist, to mocht fie fich auch nicht dampige. Alls Legerin ist die Noven-Ginte gleich gang in der geren gestellt gest febr empfinblich ift.

difchaucht.

Bflichten bes Teichfarbfenguchters nach ben Binter. Ist das Einstarpfengingeres nan der Binter. Ist das Eis von den Leichen weggedaut, bann erwachen die Fische nach 5-6 monatelangem Wintericklasse, abgemagert, mit vielem Abvectit, welchen die Vatur, noch nicht hinreichen au be-Beit ift gwijchen April und Juni gu mablen.

— Das Serantöbern von Jitchen bewirten bolländiche Angler mit Erfolg, indem sie in eine wolsterbelle Glassliche etwas Erbe, einige Regen-würmer und mehrere Inselten steden, sie dann der artig verfchlieben, das medischt menig Waster binarig verigiteren, dug megnicht neinz geunte im einsidern fann. An einem Binbfaben fetigebunden am Ufer, wird die Flaiche in das Angelwoffer ge-worfen, auf dem fie durch die Errömung fin- und herbewegt wird und durch ibr Glipern febr viele

bednitend teurer begablen els im Herbste. det aber auch mit der ilbereinisterung nichts au tan.

? Vorbengungsmittel gegen Kaulkrut. Trift in einer Gegend Aulbrut auf, in stehen die Tähnbere einer Gegend Aulbrut auf, in stehen die Tähnbere anderen Jüdster in großer Geschie bern diese stehen die S

Beinbau und Rellerwirtichaft.

* Beinfiode an Sanswanden, Obidon heute ber Grund und Boben gewaltig im Werte geftiegen ift und bemgemäß rationeller ansgenugt werden muß,

Berfegen alterer Reben. Beim Berfegen rer Reben find meift großere Berlufte gu be-ien. Ohne Berlufte wird es nun auch taum abeidigeit. The Excitient wide es nun auch ichtin de-sehen, aber fie werben um to geringer lein, je mehr bie Wurzeln gelchont und bas ältere Hols gurüf-eichmitten wird. Das ältere Hols jollte in den meisten hällen bis auf die am riefften stedenden ein-gädrigen Triebe jawei bis derit entfernt und die unt je awei Augen gelützt werden.

auf je gibei Munen neltitat werben.

Srüblingshaebteiten im Beinderge. Die Früblingshade in ben Meinbergen muß mit möglichter Gevzielte ausgefübet werben, demit man feine Burzein beidadigt und den frühtige Gederung erlalet. Der Frühlingshach foll das Einstschapen von Afdien jedoch vorausgeben, weil sonit bak mittom gelockerter Erdreich wieder feigherteien wird.

* Früher Rebichnitt. Der Schnitt ber Reben ioll möglicht fruhe beginnen, ba bie Stude beim brubicnitt nur wenig bluten.

